

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**  
**Преди употреба прочетете внимателно етикета!**

**КОРЕЛО ДУО**

**Хербицид за употреба при зимна мека и твърда пшеница**

**ГРУПА**

**2**

**ХЕРБИЦИД**



**ВНИМАНИЕ**

**Предупреждения за опасност**

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

EUN208 Съдържа пироксулам и клоквинтоцет-мексил. Може да предизвика алергична реакция.

**Препоръки за безопасност**

P391 Съберете разлятото.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби.

**Допълнително етикетирание**

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт за растителна защита или с неговата опаковка. ( Да не се почиства оборудването, с което се прилага продукт за растителна защита, близо до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра или дюзи намаляващи отвяването с 50% до неземеделски земи, с цел опазване на растенията.

**Активни вещества** – пироксулам 70,8 г/кг; флорасулам 14,2 г/кг.

**Антидот** - клоквинтоцет мексил 70,8 г/кг.

**Функция на ПРЗ** – хербицид със системно действие

**Вид на продукта** – Вододиспергируеми гранули (ВГ).

**Разрешен за употреба в България с Удостоверение № 01251- ПРЗ Издание 2/16.11.2022г. на БАБХ**

**Категория на употреба** - втора професионална

**Област на прилагане на продукта:**

Селективен вегетационен хербицид със системно действие за контрол на **житни и широколистни плевели при зимна мека и твърда пшеница**. Абсорбира се от корените и листата. Продуктът действа като АЛС инхибитор. Транслоцира се бързо посредством

флоема и ксилема до меристемната тъкан. Развитието на растението се редуцира няколко часа по-късно, въпреки че може да отнеме и няколко седмици до видим краен ефект.

**Доза на приложение и момент на приложение:**

Продуктът се прилага в доза 26,5 г продукт/дка във фенофази от „начало на братене“ до „вторият възел е най-малко 2 см над първият възел“ (BVCH 21 до BVCH 32).

**Количество работен разтвор:** 10-40 л/дка. По - малкото количество вода се използва само при малки плевели и преди културата да се съгсти.

**Техника на приложение:** механизирана наземна техника, навесна тракторна пръскачка.

**Максимален брой приложения на година:** 1.

**Карантинен срок** - времето в дни, което се изчаква за прибиране на реколтата след последното третиране с ПРЗ: не се изисква.

**Чувствителност на плевелите**

**Чувствителни плевели:** лепка (*Galium Aparine*), овчарска торбичка (*Capsella bursa-pastoris*), лайка (*Matricaria chamomilla*), врабчови чревца (*Stellaria media*), лисича опашка (*Alopecurus myosuroides*), многолистен райграс (*Lolium spp.*), дива ряпа (*Raphanus raphanistrum*), полски синап (*Sinapis arvensis*), великденче (*Veronica spp.*), полска теменуга (*Viola arvensis*).

**Средно чувствителни плевели:** див овес (*Avena spp.*), полски мак (*Papaver rhoeas*), пача трева (*Polygonum aviculare*), видове овсига (*Bromus spp.* различен от *B. mollis*), фаларис (*Phalaris spp.*).

- По време на приложение да се осигури добро покритие, тъй като продукта се абсорбира главно чрез листата.
- Ефикасността може да изглежда намалена, когато почвата е много суха или температурите са ниски, условия водещи до бавно развитие на плевелите.
- Не контролира чувствителни плевели поникнали след третирането.
- Продуктът не се измива от дъжд паднал един час след третирането.
- Да не се прилага при култури понасящи стрес от ниски температури, суша, наводнения, повреда от неприятели, липса на хранителни елементи и др. Да не се прилага преди пълно братене в периоди с екстремни климатични условия (ниски температури и / или обилни валежи).
- При пшеницата могат да се появят преходни повреди при неблагоприятни климатични условия (продължителни валежи или много студено време), но те не влияят отрицателно на добива.
- При неблагоприятни климатични условия (много високи или много ниски температури), може да настъпи временно забавяне в развитието на културата, но това не се отразява на крайния резултат.
- За по-добри резултати да се третират плевели в началото на техния активен растеж. (особено при фаларис и дивия овес да се прилага в начало на братене).

Продуктът се прилага с прилепител DASSOIL 26-2N в доза 50 мл прилепител/дка.

**Работа с продукта**

Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици по време на смесване/зареждане и прилагане на продукта.

Да не се поглъща. Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. Избягвайте вдишване на прах или пари. Измивайте се изцяло след работа. Дръжте контейнерите

затворени. Да се използва при подходяща вентилация. За безопасното боравене с продукта е необходим контрол на запрашеността.

### **Приготвяне на работния разтвор**

Напълнете до половината резервоара на пръскачката с чиста вода. Да се разбърква непрекъснато.

Добавете бавно и внимателно необходимото количество от КОРЕЛО ДУО без да прекъсвате разбъркването. Уверете се, че КОРЕЛО ДУО се е диспергирал добре и не е полепнал по вътрешните страни на резервоара. Допълнете с вода резервоара до необходимия обем, като разбърквате непрекъснато дори и по време на пръскане.

### **Препоръки за почистване на пръскачката**

За да се избегнат в последствие повреди върху култури различни от зърнено - житни, цялата пръскачна техника трябва да се измие внимателно, както отвътре, така и отвън.

1. Веднага след приключване на работа изпразнете напълно резервоара. Замърсяванията от външната страна на пръскачната техника се измиват с чиста вода.
2. Изплакнете вътрешната страна с чиста вода и промийте тръбите и щангите с поне 1/10 от обема на резервоара. Изпразнете резервоарът напълно.
3. Напълнете резервоара до половината с чиста вода. Добавете 250 г детергент, разтворен в 100 л вода и разбъркайте за кратко. Допълнете до горе с вода, като се уверите, че резервоарът е пълен до горе. Разбъркайте 10 – 15 минути, промийте маркучите и щангите и изпразнете напълно резервоара.

Повторете същата процедура.

4. Дюзите и филтрите трябва да се свалят и да се измият по отделно с вода и сапун.
5. Изпразнете напълно резервоара.
6. За изхвърляне / обезвреждане на промивните води, следвайте нормативните изисквания. Не пръскайте върху чувствителни култури или върху площи предназначени за отглеждане на чувствителни култури.

### **Управление на резистентността**

Продуктът е АЛС инхибитор. Да не се използва повече от един път на вегетационен сезон. Да не се използва в поредица с хербициди със същия механизъм на действие. Може да се прилага под формата на резервоарна смес с други хербициди със същия механизъм на действие, за разширяване спектъра на действие. В случай на поява на устойчиви към продукта плевели, се препоръчва той да бъде смесен или редуван с хербициди с различен механизъм начин на действие.

### **Смесимост/съвместимост:**

Да не се използва в резервоарна смес с:

1. растежни регулатори (интервал между приложенията: 7 дни)
2. органофосфорни инсектициди (минимален интервал между приложенията: 14 дни).

### **Пропадане на културата**

В случай на пропадане на културата може да се засее царевица, сорго и зърнено-житни култури 6 седмици след приложението на продукта сред като е извършена оран.

### **Следващи в сеитбооборота култури**

В съответствие с Добрата Зеделска Практика и нормалният сеитбооборот, следващ прибирането на пшеницата третирана с този продукт, няма ограничения тъй като последващите култури не предизвикват загриженост.

### **Период след който могат да влизат животни и хора в третираната площ**

Животни: няма

Работници: не се прилага. Основно правило е да не се влиза в третираната площ докато разтвора не изсъхне напълно.

### **Фитотоксичност**

Продуктът е хербицид. Може да причини фитотоксичност на чувствителните култури, които не са споменати на етикета.

Култури които не са споменати в този етикет да се пазят от контакт с работния разтвор.

### **Първа помощ и медицински съвети**

**Вдишване:** Пострадалият да се изведе на чист въздух. Ако лицето не диша, да се повика бърза помощ, след което да се приложи изкуствено дишане; ако се използва метода "уста-в-уста", да се вземат мерки за защита на спасителя (маска и пр.). За съвет относно лечението, позвънете на контролния център за случаи на отравяне, или извикайте лекар.

**Контакт с кожата:** Съблечете замърсеното облекло. Кожата незабавно да се изплакне с обилно количество вода за период от 15-20 минути. За съвети по лечението се обърнете към центъра за помощ при отравяния или към лекар.

**Контакт с очите:** Задръжте очите отворени и бавно и внимателно промийте с вода в продължение на 15-20 минути. След първите 5 минути, да се отстранят контактните лещи, ако има такива, след което продължете с промиването на очите. За съвети по лечението се обърнете към центъра за помощ при отравяния или към лекар.

**Поглъщане:** Никакво медицинско лечение не е необходимо при извънредни ситуации.

### **Специални средства за оказване на първа помощ на работното място**

Няма специфичен антидот. Лечението е поддържащо/симптоматично.

При необходимост се свържете с Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов“

Телефон за спешни случаи: +359 2 9154 233 (денонощен);

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112.

### **Препоръки за безопасно изхвърляне / обезвреждане на продукта и опаковките му:**

Изгаряне в одобрени за целта инсталации според местното законодателство. Празните опаковки (бутилки и торби) трябва да се измият с вода под налягане или да се изплакнат трикратно (водата от изплакване на опаковката да се добави в резервоара на пръскачката) и след това да се унищожат, с оглед да не бъдат използвани за други нужди.

### **Условия за съхранение и срок на годност**

Да се съхранява на сухо място. Съхранявайте в оригиналния контейнер. Да не се съхранява в близост до храна, хранителни продукти, лекарства или източници на питейна вода. При тези условия, продуктът остава стабилен в продължение на 2 години след датата на производство.

**Дата на производство:** виж опаковката

**Партида №** Виж опаковката

**Тегло:** от 0.25 до 10 кг (0.25 – 20 л) HDPE Бутилки и 0.25 – 10 кг LDPE/ALU/PA торби

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО:**

Кортева Агрисайънс България ЕООД

Седалище и адрес на управление: Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 1А, ет. 1,  
София, 1766, България

**Дистрибутор:**

Кортева Агрисайънс България ЕООД

|